

吸収にすぐれた活性型ビタミンB2が主薬の「チョコラBB」のパワーアップ商品

No61 チョコラBBプラス 60錠

第3類医薬品



■効能効果

次の諸症状の緩和

肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB2の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

■用法・容量

次の量を朝夕食後に水またはお湯で服用してください。

年齢1回量1日服用回数

成人(15歳以上)1錠2回

小児(15歳未満)服用しないこと

●なめていると苦味を感じることがあります。早めによりこんでください。

■成分・分量

成人1日量2錠中の成分

リン酸リボフラビンナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)38mg

塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)50mg

硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)20mg

ニコチン酸アミド40mg

パントテン酸カルシウム20mg

(1)添加物として、タルク、炭酸カルシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、アラビアゴム、カルナウバロウ、カルミン、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、セラック、セルロース、二酸化ケイ素、白糖、ビタミンB2、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素カルシウムを含有します。

(2)本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれているビタミンB2が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

■使用上の注意

相談すること

1、次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位症状

皮ふ発疹

消化器胃部不快感

(2)1か月位服用しても症状:

2、次の症状があら:

下痢