

目のかゆみ結膜充血に
No47 ★爽AL目薬 16ml



製品の特徴 花粉やハウスダスト(室内のほこり、ダニ等)によるアレルギー等で目のかゆみや結膜充血等の不快な症状を起こす人が増えています。
本剤には目のかゆみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、結膜充血を取り除く塩酸テトラヒドロゾリン、炎症をしずめるアラントイン、グリチルリチン酸二カリウム、目に栄養を与え、働きを活発にするタウリンを配合しています。

使用上の注意 ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[関係部位: 症状]
皮膚: 発疹・発赤、かゆみ
目: 充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果 目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いと

効能関連注意 1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

用法・用量 (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。

用法関連注意 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
(4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
(5) 点眼用에만使用して下さい。

成分分量 100mL中

成分	分量
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
塩酸テトラヒドロゾリン	20mg
アラントイン	100mg
グリチルリチン酸二カリウム	100mg
タウリン	500mg

添加物 クエン酸、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、エデト酸Na、トメントール、dl-カンフル、ゲラニオール、ポリソルベート80、プロピレングリコール、濃ベンザルコニウム塩化物液50

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4) 他の人と共用しないで下さい。
(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
(6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

消費者相談窓口 会社名: 第一三共ヘルスケア株式会社
住所: 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
問い合わせ先: お客様相談室
電話: 03(5205)8331
受付時間: 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
その他: ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>
テイカ製薬(株)住所: 富山市荒川1-3-27
第一三共ヘルスケア(株)添付文書情報: K0706000011_02_B.pdf

**製造販売会社
販売会社**