

つらい目の疲れ・かすみに8種の有効成分が効く
No51 スマイル40EXゴールド 13ml



製品の特徴	[8種の有効成分が効く] ■トリプルビタミン処方 血行促進・新陳代謝促進作用で目の疲れ・かすみに効果を発揮…ビタミンA・ビタミンE・ビタミンB6 ■ダブルアミノ酸処方 2種の栄養成分が疲れた瞳に直接届く…タウリン・L-アスパラギン酸カリウム ■ピント調節 目の筋肉の疲れをほぐす…ネオスチグミンメチル硫酸塩 ■かゆみ・充血を抑える ●抗ヒスタミン作用で、かゆみ抑制…クロルフェニラミンマレイン酸塩 ●目の充血を改善…塩酸テトラヒドロソリン																		
使用上の注意	■相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人。緑内障 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [関係部位: 症状] 皮膚: 発疹・発赤、かゆみ 目: 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 目のかすみが改善されない場合。 (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。																		
効能・効果	目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感																		
効能関連注意																			
用法・用量	1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。																		
用法関連注意	(1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえて充血を招くことがあります。 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。 (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 (5) 点眼用のみ使用してください。																		
成分分量	100mL中																		
	<table><tr><th>成分</th><th>分量</th></tr><tr><td>レチノールパルミチン酸エステル</td><td>33000単位</td></tr><tr><td>酢酸d-α-トコフェロール</td><td>0.05g</td></tr><tr><td>ピリドキシン塩酸塩</td><td>0.03g</td></tr><tr><td>L-アスパラギン酸カリウム</td><td>1g</td></tr><tr><td>アミノエチルスルホン酸(タウリン)</td><td>0.1g</td></tr><tr><td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>0.03g</td></tr><tr><td>塩酸テトラヒドロソリン</td><td>0.01g</td></tr><tr><td>ネオスチグミンメチル硫酸塩</td><td>0.005g</td></tr></table>	成分	分量	レチノールパルミチン酸エステル	33000単位	酢酸d- α -トコフェロール	0.05g	ピリドキシン塩酸塩	0.03g	L-アスパラギン酸カリウム	1g	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	0.1g	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	塩酸テトラヒドロソリン	0.01g	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005g
成分	分量																		
レチノールパルミチン酸エステル	33000単位																		
酢酸d- α -トコフェロール	0.05g																		
ピリドキシン塩酸塩	0.03g																		
L-アスパラギン酸カリウム	1g																		
アミノエチルスルホン酸(タウリン)	0.1g																		
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g																		
塩酸テトラヒドロソリン	0.01g																		
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005g																		
添加物	ホウ酸、トロメタモール、エデト酸ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、d-ボルネオール、等張化剤、pH調節剤																		

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6)容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

消費者相談窓口 会社名:ライオン株式会社

お問合せ先:お客様センター お問い合わせのお店又は下記にお問合せください

電話:0120-813-752

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売会社 ライオン(株)添付文書情報: J1001000020_02_A.pdf

会社名:ライオン株式会社

住所:〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7