

1日1回の服用で日常生活の中で感じる「疲労」にすぐれた効果を発揮します。  
No66 リポビタンDX錠 90錠

指定医薬部外品



#### ■使用上の注意

・相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位：症状  
皮膚：発疹  
消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### ■効能・効果

・疲労の回復・予防

・日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）

・体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善

・虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）

・病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

#### ■用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年齢：1回量：1日服用回数  
成人(15歳以上)：3錠：1回  
15歳未満：服用しないこと

#### <用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

(2)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。

(変色の原因となり、品質が変わることがあります)

#### 「最初に服用する時に」

(1)瓶口シールをはがして捨ててください。

(2)詰め物を取り出して捨ててください。

(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)

#### ■成分・分量

成分：分量（3錠中）

タウリン 500mg

チアミン硝酸物（ビタミンB1）：10mg

リポフラビン（ビタミンB2）：5mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）：5mg

アスコルビン酸カルシウム：100mg（ビタミンCとして 82.6mg）

カルニチン塩化物：10mg

グリシン：5mg

サンヤク末：10mg

シゴカ乾燥エキス：8mg（シゴカ200mg に相当）

添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

- ・本剤は、生薬を用いた製品ですから、製品により色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。
- ・本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません。

■保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。  
(品質保持のため)

「原産国」

日本

「問い合わせ先」

会社名：大正製薬株式会社「お客様119番室」

電話：03-3985-1800

受付時間：8:30～21:00（土、日、祝日を除く）

「製造販売元」

会社名：大正製薬株式会社

住所：東京都豊島区高田3丁目24番1号