

うがい薬：口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄，口臭の除去 No37 イソジンうがい薬 50ml

第3類医薬品



使用上の注意

●してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

(3) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

口 あれ、しみる、灼熱感、刺激感

消化器 吐き気

その他 不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称 症状

ショック(アナフィラキシー) 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があら

3.5-6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回、本剤2-4mlを水約60mlにうすめて、1日数回うがいしてください

【用法・用量に関連する注意】

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●本剤はうがい用のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。

●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

●本剤は使用するときにおすすめ、早めに使用してください。

成分・分量

1ml中 ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)

添加物としてエタノール、l-メントール、サッカリンナトリウム、香料を含有しています。

【成分・分量に関連する注意】

●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。

(5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話:(大阪)06-6209-6948、(東京)03-3406-8450
受付時間:9時-17時(土、日、祝日を除く)

販売元

シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元

ムンディファーマ株式会社
東京都港区港南2-15-1