

胃腸薬:脂っこい食事や食べ過ぎなどによっておこる胃のもたれにすぐれた効果をあらわします
No40太田胃散A錠剤 45錠

第2類医薬品



使用上の注意

1. 次の人は服用しないで下さい

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないで下さい

次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1、次の人は服用しないでください 透析治療を受けている人

2、長期連用しないでください

相談すること

1、次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)本人又は家族がアレルギー症状を起こしたことがある人

(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5)次の診断を受けた人 腎臓病

2、次の場合は直ちに服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状が出た場合

(2)2週間位服用しても症状が良くならない場合

用法・用量

次の量を食後又は食間(就寝前を含む)に服用してください。ただし、食欲不振の場合は食前に服用してください。

かんで服用してもさしつかえありません。

・1回量 成人(15歳以上)3錠 8～14歳 2錠 5～7歳 1錠 5歳未満 服用しないこと。

・食後または食間に1日3回

【成分:1日量(9錠)中】

リパーゼAP6・・・60mg

プロザイム6・・・30mg

ビオチアスターゼ1000・・・60mg

ウルソデオキシコール酸・・・12.6mg

炭酸水素ナトリウム・・・1530mg

合成ヒドロタルサイト・・・900mg

沈降炭酸カルシウム・・・270mg

ケイヒ油・・・10.40mg

レモン油・・・4.46mg

ウイキョウ油・・・1.65mg

添加物: L-メントール、乳糖、黄色4号(タートラジン)、アラビアゴム、ステアリン酸Mg、炭酸Mg、カルメロースCa、セル

ロース、天然ビタミンE

保管および取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

消費者相談窓口 株式会社太田胃散「お客様相談室」

電話: (03)3944-1311(代表)

受付時間: 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売会社 株式会社太田胃散 添付文書情報: J0601002826_03_A.pdf

東京都文京区千石2-3-2