

引きはじめのかぜに効果、体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手の痛みや肩の痛み。

No14 ★シオノギ 葛根湯エキス顆粒 12包



用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
(8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

〔関係部位：症状〕

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに次の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

〔症状の名称〕

偽アルドステロン症：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5?6回）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

効能関連注意

用法・用量 次の量を1日3回食前または食間に、水またはぬるま湯でおのみください。

〔年齢：1回量：1日服用回数〕

成人（15才以上）：1包：3回

7才以上15才未満

4才以上7才未満

2才以上4才未満：1／3包：3回

2才未満：服用させないこと

用法関連注意 ●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分分量 3包(6g)中

成分

分量

内訳

葛根湯エキス(3／4量) 3600mg (カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール, 乳糖水和物, 含水二酸化ケイ素
保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない, 涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり, 品質が変化します)

(4)1包を分割した残りを使用する場合には, 袋の口を折り返して保管し, 2日以内に使用してください。

(5)使用期限をすぎた製品は, 服用しないでください。

消費者相談窓口 会社名:シオノギヘルスケア株式会社

問い合わせ先:医薬情報センター

電話:大阪06-6209-6948, 東京03-3406-8450

受付時間:9時?17時(土, 日, 祝日を除く)

製造販売会社 大峰堂薬品工業(株)奈良県大和高田市根成柿574

販売会社 シオノギヘルスケア(株)添付文書情報: J1701000181_01_B.pdf

剤形 散剤

リスク区分 第2類医薬品