

肩の痛み、腰痛・筋肉痛に！つらい痛みの元に直接浸透 1日1回24時間効果を持
続 ロキソプロフェンNa水和物を8.1%配合した、貼りなおせるテープ剤
No78 ★オムニードLXテープ 14枚

第2類医薬品



第2類医薬品／肩こり・腰痛・筋肉痛の薬／日本製

内容量

14枚入

サイズ

7cm×10cm

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、
腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）

用法・用量

●表面のライナー（フィルム）をはがし、1日1回患部に貼付してください。

●15歳未満の症には使用しないでください。

≪用法・用量に関連する注意≫

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。

(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。

(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1-2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

膏体100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.1g（無水和物として7.14g）

添加物：ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリイソブチレン、ジブチルヒドロキシトルエン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、l-メントール、その他2成分

[1枚（7cm×10cm）あたり膏体0.7g]

ご注意

●してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。

(3)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください（本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください）

●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(4)高齢者

(5)次の診断を受けた人

気管支ぜんそく

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[関係部位]:[症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着

消化器:胃部不快感、みぞおちの痛み

その他:むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称]:[症状]

ショック(アナフィラキシー):使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢・軟便

4.5-6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性もあります)