

ものもらい・結膜炎に小さなお子様にも
No56 抗菌アイリス使い切り 18本



製品の特徴

◆抗菌アイリス使い切りは、四種の有効成分の働きにより、ものもらい・結膜炎の原因菌の繁殖を抑え、かゆみなどの炎症を鎮め、炎症で傷ついた目の状態を改善します。
◆独自技術を用いた製剤設計により、薬液が目の表面に長く留まります。

使用上の注意

■してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位：症状]

皮膚：発疹・発赤、かゆみ
目：充血、かゆみ、はれ

3. 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

効能関連注意

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

用法・用量

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

用法関連注意

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。

(4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(5) 点眼用のみ使用してください。

(6) 無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください

○(7) 本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有していませんので、使用後の残液は捨ててください。

※本剤は、滞留性のある製剤であるため、点眼後しばらく視野がぼやけることがありますので注意してください。

容器の先で目を傷つけないように注意してください。

成分分量

成分	分量
スルファメキサゾール	4%
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%
イブシロン-アミノカプロン酸	1%
ピリドキシン塩酸塩	0.10%

添加物

ジェランガム、トロメタモール、クエン酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 本剤は光による薬液の変質を防ぐため、着色容器・着色袋を使用しておりますが、保存する場合は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。

(6) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)

(7) ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。

(8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

消費者相談窓口

会社名：大正製薬株式会社

問い合わせ先：お客様119番室

電話：03-3985-1800

受付時間：8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

製造販売会社
その他：<http://www.taisho.co.jp>
大正製薬(株) 添付文書情報：J1401000026_01_A.pdf
会社名：大正製薬株式会社
住所：東京都豊島区高田3丁目24番1号