

しみ・そばかすなどの色素沈着の緩和、歯ぐきや鼻からの出血予防に No65アリアナ ビタミンC2000 240錠

第3類医薬品



使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

○フェニルケトン尿症の人

■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ

消化器:吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状※の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合※の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血

次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

効能関連注意

ただし、これらの症状※について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。

用法・用量

次の量を服用してください。

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中で溶かすか、又はかみくだいて服用してください。

[年齢:1回服用量:1日服用回数]

成人(15歳以上):4錠:2~3回

11歳以上15歳未満:2・1/2錠:2~3回

7歳以上11歳未満:2錠:2~3回

5歳以上7歳未満:1錠:2~3回

5歳未満:服用しないこと

用法関連注意

1. 定められた用法・用量をお守りください。

2. 5歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分分量

12錠中

成分	分量
ビタミンC	2000mg
リボフラビン	6mg

内訳

(アスコルビン酸1000mg、L-アスコルビン酸ナトリウム1124.79mg)

添加物

還元麦芽糖水アメ、白糖、乳糖、ステアリン酸マグネシウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリン、香料、トコフェロール

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)また、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。

4. 容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後は

そのつど必ずフタをしっかりとめてください。

5. 1錠を分割した残りを服用する場合は、清潔な紙に包んで外箱の中に保管し、2日以内に服用してください。

6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

7. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

消費者相談窓口

会社名:日野薬品工業株式会社

問い合わせ先:お客様相談窓口

電話:0748-52-1232

受付時間:9時~17時(土、日、祝日を除く)

製造販売会社

日野薬品工業(株)添付文書情報: K1406000005_01_A.pdf

会社名:日野薬品工業株式会社

住所:滋賀県蒲生郡日野町上野田119