

虫さされ・かゆみにお子様のかきこわし防止に No75 ★マキロンかゆみどめパッチ 24パッチ



製品の特徴

かきこわしを防止

- 2種類のかゆみどめ成分配合
- 炎症をおさえる成分配合
- 水につよく、ムレにくい

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。
傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[関係部位: 症状]

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

皮膚(患部): 色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

貼付後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、しもやけ

効能関連注意

用法・用量

用法関連注意

パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。
- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。
- (5) 同じ場所に長時間使用しないで下さい。

成分分量

本品の膏体100g(1.25m²)中

成分	分量
ジフェンヒドラミン	1.0g
グリチルレチン酸	0.5g
クロタミトン	5.0g
イソプロピルメチルフェノール	1.0g

(直径2.0cm×24枚)

添加物

メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、トメントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者相談窓口

会社名: 第一三共ヘルスケア株式会社
住所: 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
問い合わせ先: お客様相談室
電話: 0120-337-336

製造販売会社

受付時間: 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
救急薬品工業株式会社 添付文書情報: J0601006916_07_A.pdf
会社名: 救急薬品工業株式会社

販売会社

住所: 〒939-0351 富山県射水市戸破32-7
第一三共ヘルスケア株式会社