

かぜの諸症状(のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

## No1 ★新プレコールS顆粒 18包

### 第②類医薬品



#### 製品の特徴

1. 眠気をもよおす主な原因とされている抗ヒスタミン剤を含まないかぜ薬です。
2. アセトアミノフェンとエテンザミドの2つの鎮痛・解熱成分により、すぐれた効きめをあらわします。
3. dl-メチルエフェドリン塩酸塩を配合していますので、気管支を拡張し、せきをやわらげます。
4. 胃粘膜保護成分「グリシン」を配合していますので、胃をいたわるかぜ薬です。

#### 使用上の注意

##### ■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬
3. 服用前後は飲酒しないで下さい。
4. 長期連用しないで下さい。

##### ■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 授乳中の人
  - (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
  - (5) 高齢者
  - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (7) 次の症状のある人: 高熱
  - (8) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

##### [関係部位: 症状]

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、はれ  
消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振  
精神神経系: めまい  
その他: 過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

##### [症状の名称: 症状]

ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群): 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

中毒性表皮壊死融解症: 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害:発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。  
 腎障害:発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。  
 間質性肺炎:階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる, 空せき, 発熱等がみられ, これらが急にあらわれたり, 持続したりする。  
 ぜんそく:息をするときゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しい等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果  
 効能関連注意  
 用法・用量

かぜの諸症状(のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

[年齢:1回量:1日服用回数]

成人(15歳以上):1包:3回(食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい)  
 11歳以上15歳未満:2/3包:3回(食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい)  
 7歳以上11歳未満:1/2包:3回(食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい)  
 3歳以上7歳未満:1/3包:3回(食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい)  
 3歳未満:服用しないで下さい。

用法関連注意

(1)用法・用量を厳守して下さい。  
 (2)3歳以上の小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分分量

3包(3g)中

成分	分量
アセトアミノフェン	480mg
エテンザミド	690mg
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg
無水カフェイン	150mg
グリシン	180mg
ケイヒ末	150mg

添加物

トウモロコシデンプン, デキストリン, 白糖, グリチルリチン酸二カリウム, 二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。  
 (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。  
 (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)  
 (4)1包を分割した残りを服用する場合は, 袋の口を折り返して保管し, 2日以内に服用して下さい。  
 (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者相談窓口

会社名:第一三共ヘルスケア株式会社  
 住所:〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
 問い合わせ先:お客様相談室  
 電話:03(5205)8331  
 受付時間:9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く)

製造販売会社

ホシエヌ製薬(株)添付文書情報: J1201000159\_02\_A.pdf

販売会社

会社名:ホシエヌ製薬株式会社  
 住所:奈良県五條市住川町1380番地  
 第一三共ヘルスケア(株)添付文書情報: J1201000159\_02\_B.pdf