

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

No36 新ルルエースのどスプレーa 30ml

第3類医薬品



1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (2) 授乳中の人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 口内のひどいただれ
- (5) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ
口:あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器:吐き気
その他:不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

[症状の名称:症状]ショック(アナフィラキシー):使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

効能関連注意

用法・用量 1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

用法関連注意●使用法を厳守して下さい。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

●のどの粘膜面にのみ使用して下さい。

●目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。

●息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルの先端を患部に向けアーンと声を出しながら適量を噴射塗布して下さい。

成分分量 100mL中

成分 分量

ポビドンヨート450mg

添加物 ヨウ化カリウム、グリセリン、トメントール、香料、pH調節剤、エタノール

保管及び取扱い(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。

(5)火気に近づけないで下さい。

(6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者相談先:会社名:第一三共ヘルスケア株式会社

お問い合わせ先:お客様相談室

電話:0120-337-336

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売会社 ジャパンメディック株式会社 添付文書情報
会社名: ジャパンメディック株式会社
住所: 富山県富山市横越168
販売会社 第一三共ヘルスケア株式会社
剤形 噴霧剤
リスク区分等 第3類医薬品