

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾時の肛門の殺菌・消毒
No77 マキロンS 40ml

第3類医薬品



使用上の注意 ■相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

効能関連注意
用法・用量
用法関連注意

- 1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。
- (1) 使用法を厳守すること。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 - (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
 - (4) 外用にのみ使用すること。

成分分量

100mL中

成分	分量
ベンゼトニウム塩化物	0.1g
アラントイン	0.2g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g

添加物 エタノール、塩化ナトリウム、pH調節剤、香料、チモール、トメントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れることがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

消費者相談窓口

会社名：第一三共ヘルスケア株式会社
問い合わせ先：お客様相談室
電話：0120-337-336

製造販売会社

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
第一三共ヘルスケア(株) 添付文書情報：K1103000035_04_A.pdf
会社名：第一三共ヘルスケア株式会社
住所：東京都中央区日本橋3-14-10