

虫さされ・かゆみ・肩こりに
No72 キンカン 55ml



第2類医薬品

使用上の注意 ■してはいけないこと
〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等
(2)かぶれ、傷口
2. かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けしないでください。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)湿潤やただれのひどい人
(4)皮膚の特に弱い人や乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

3. 本品を5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

効能関連注意

用法・用量

用法関連注意

1日数回、患部に適量を塗布してください。

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。

(3)外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

成分分量

100mL中

成分	分量	内訳
アンモニア水	21.3mL	
ヒメントール	1.97g	
d-カンフル	2.41g	
サリチル酸	0.57g	
トウガラシチンキ	0.35mL	(トウガラシ35mg)

添加物

保管及び取扱

い上の注意

(1)小児の手の届かない所に保管してください。

(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(3)溶剤としてアルコールを含んでいるため、次の事項に充分注意してください。

●暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。

●車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。

●プラスチック類、繊維製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。

(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

消費者相談窓口

会社名:株式会社金冠堂

問い合わせ先:お客様相談室

電話:03-3421-6171

受付時間:9:00~16:00 月~金(祝日を除く)

その他:<http://www.kinkan.co.jp>

製造販売会社

(株)金冠堂 添付文書情報: J0601006497_03_A.pdf

会社名:株式会社金冠堂

住所:〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

販売会社

(株)キンカン