

胃腸薬:飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に No39太田胃散 分包 16包

第2類医薬品



製品の特徴

現代の食生活では、不規則な食事、嗜好品のとり過ぎなど、胃に負担をかけてしまうことが多くなっています。太田胃散(分包)は、健胃生薬(自然薬物)に制酸剤、消化酵素を配合した現代の食生活にマッチした胃腸薬です。飲みすぎ、胸やけ、胃のもたれなどの不快な症状に、おだやかですぐれた効きめをあらわします。毎日の食生活を快適に過ごしていただけるよう、太田胃散(分包)をお役立てください。

■生薬が胃の働きを改善

七種の健胃生薬の効果的な配合が胃の働きを良好にし、飲みすぎ、食べすぎ、胃のもたれなどの不快な症状の改善に役立ちます。また、胃の弱った方や食欲のない方にも健胃生薬は有効です。

■制酸剤が胃酸を中和

作用の異なる制酸剤を配合することで、胃の中の酸度を調整し、胸やけ、胃痛、胃部不快感にすぐれた効果をあらわすとともに、消化酵素を働きやすいようにします。

■さわやかな服用感と確かな効きめ

生薬特有の芳香味と効きめを生かすために散剤の形にしています。生薬の芳香味が「メントールの清涼感、制酸剤の働きと相まってスッキリとした爽快な服用感をもたらします。また散剤なので胃の中で早く作用します。

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べ過ぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、吐き気(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

効能関連注意

用法・用量

次の量を食後又は食間に服用してください。

[年齢:1回量:1日服用回数]

成人(15歳以上):1包:3回

8~14歳:1/2包:3回

8歳未満:服用しないこと

用法関連注意

成分分量

※食間とは食後2~3時間のことをいいます。
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

1包(1.3g)中

成分	分量
ケイヒ	92mg
ウイキョウ	24mg
ニクズク	20mg
チョウジ	12mg
チンピ	22mg
ゲンチアナ	15mg
ニガキ末	15mg
炭酸水素ナトリウム	625mg
沈降炭酸カルシウム	133mg
炭酸マグネシウム	26mg
合成ケイ酸アルミニウム	273.4mg

	<table border="1"> <tr> <td>ビオチン</td><td>40mg</td></tr> </table>	ビオチン	40mg
ビオチン	40mg		
添加物	トメントール		
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。		
消費者相談窓口	株式会社太田胃散「お客様相談室」 電話: (03)3944-1311(代表) 受付時間: 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)		
製造販売会社	株式会社太田胃散 添付文書情報: J0601002826_03_A.pdf 東京都文京区千石2-3-2		