

かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

No5 ★コンタック総合感冒薬EX 18カプセル

第②類医薬品



製品の特徴

- 発熱、のどの痛み、せき、鼻みずなど、かぜの諸症状にすぐれた効果を発揮
- ・2種類の解熱鎮痛剤が発熱、のどの痛み、頭痛、関節の痛みに効果を発揮します。
 - ・抗ヒスタミン剤が鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。
 - ・気管支拡張剤がせきを抑え、たんの排出をたすけます。

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザににかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
(5) 高齢者。
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ
消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系: めまい
泌尿器: 排尿困難
その他: 過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性

汎発性発疹性腫瘍症、発熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範

效能・効果

かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法関連注意

成人(15歳以上):2カプセル:3回

7歳以上15歳未満:1カプセル:3回

7歳未満：服用しないこと

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 7～14歳に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)カプセルの取り出し方:カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

6カプセル(成人1日量)中	
成分	分量
アセトアミノフェン	500mg
エテンザミド	400mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
無水カフェイン	120mg

トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na

①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所で保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

問合せ先: グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 お客様相談室

電話：03-5786-6315

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。

連絡先: (財)日本中毒情報センター 中毒110番

電話：072-727-2499（24時間、365日対応）

テイカ製薬株式会社住所:富山県富山市荒川一丁目3番27号

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 添付文書情報: K0902000029_05_B.pdf