

目のかゆみ・結膜充血に

No50 ★ロートアルガード目薬 10ml



使用上の注意 ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人…緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[関係部位：症状]
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
目：充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果 目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの

効能関連注意
用法・用量
用法関連注意

- 1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。
- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
 - (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 - (5) 点眼用にのみご使用ください。

成分分量

成分	分量
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01%
ピリドキシン塩酸塩	0.10%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、l-メントール、d-カンフル、d-ボルネオール、エデト酸ナトリウム、ポリソルベート80、pH調節剤
保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。

- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
 - (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (5) 他の人と共用しないでください。
 - (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
 - (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
 - (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。
- * 目がかゆい時はまぶたをこすったり、刺激をくわえないようご注意ください。

消費者相談窓口

問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク
電話：東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

製造販売会社

受付時間：9:00～18:00(土、日、祝日を除く)
ロート製薬(株) 添付文書情報：J0601012928_02_A.pdf
会社名：ロート製薬株式会社
住所：大阪市生野区巽西1-8-1