

コンタクトレンズしたまま点眼タウリンを配合した涙液型目薬です。 NO52 大正製薬 アイリスCL-I ネオ (30本入)

第3類医薬品



アイリスCL-Iネオは、タウリンを配合した涙液型目薬です。

＜コンタクトレンズしたまま点眼＞

コンタクトレンズに吸着して蓄積され、変性の原因となる成分を配合していません。

だから、ソフト、ディスボーズザブルをはじめO2、ハードコンタクトレンズを装着したまま、安心して点眼でき、コンタクトレンズをした目をやさしくいたわります。

＜ドライアイ(目のかわき)点眼＞

乾いた目への刺激やトラブルの一因と言われている防腐剤を配合せず、涙の成分(塩化ナトリウム、塩化カリウム)にタウリンを配合。

だから、乾いた目にうるおいと栄養を与え、パソコン使用時などのドライアイ(目のかわき)、目のつかれをやさしく改善します。

【使用上の注意】

＜相談すること＞

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み

(4) 次の診断を受けた人。…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位…症状

皮膚…発疹・発赤、かゆみ

目…充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 目のかすみが改善されない場合。

(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【用法・用量上の注意】(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。

(4) 点眼用にはみ使用してください。

(5) 無理にひっぱって開封しないでください。

また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。

(6) 本剤は「一回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。

【成分・分量】

タウリン…1.0%、塩化ナトリウム…0.56%、塩化カリウム…0.113%

添加物…炭酸水素Na、pH調節剤

【保管及び取扱いの注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。

(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)

(6) スポンジの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。

(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

(品質保持のため)

●メーカー：大正製薬

〒170-8633

東京都豊島区高田3丁目24番1号

03-3985-1111

●副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

0120-149-931(フリーダイヤル)