

せき中枢に直接作用し、つらいせきの症状にすぐれた効果を発揮する非麻薬性のせき止め薬

## No13 ★メジコンせき止め錠Pro 20錠

### 第②類医薬



#### 【効能 効果】

せき

#### 【用法 用量】

次の量を水またはぬるま湯でおのみください。

また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

【年齢：1回量：1日服用回数】

成人(15才以上):2錠:3回

・定められた用法・用量を厳守してください。

・錠剤の取り出し方

錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる)

#### 【成分】

メジコンせき止め錠 Proは、白色の錠剤で、6錠(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

【成分：含量(6錠中)：はたらき】

デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物：90mg：せきを止める

添加物として 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、白色セラック、ヒマシ油を含有しています。

#### 【注意事項】

##### ★使用上の注意

・してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

・相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

(4) 次の症状のある人

高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【関係部位：症状】

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振

精神神経系：めまい

呼吸器：息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

【症状の名称：症状】

ショック(アナフィラキシー)：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

★保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)PTPシートから出して他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

【医薬品販売について】

- 1.医薬品については、ギフトのご注文はお受けできません。
- 2.医薬品の同一商品のご注文は、数量制限をさせていただいております。ご注文いただいた数量が、当社規定の制限を越えた場合には、薬剤師、登録販売者からご使用状況確認の連絡をさせて
- 3.効能・効果、成分内容等をご確認いただくようお願いします。
- 4.ご使用にあたっては、用法・用量を必ず、ご確認ください。
- 5.医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」を必ずお読みください。
- 6.アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。
- 7.医薬品の使用等に関するお問い合わせは、当社薬剤師がお受けいたします。

TEL:050-5577-5043

email:rakuten24\_8@shop.rakuten.co.jp

【原産国】

日本

【ブランド】

メジコン

【発売元、製造元、輸入元又は販売元】

シオノギヘルスケア

：とがあります。)

いただきます。予めご了承ください。