

引きはじめのかぜに効果、体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手の痛みや肩の痛み。

No18 ★シオノギ 葛根湯エキス顆粒 12包



用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の診療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
(8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9) 次の診察を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

[関係部位・症状]

皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに次の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称]

偽アルドステロン症：手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1か月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には576回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
- 長期服用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

効能関連注意

用法・用量 次の量を1日3回食前または食間に、水またはぬるま湯でおのみください。

[年齢・1回量・1日服用回数]

成人（15才以上）：1包、3回
7才以上15才才
4才以上7才才
2才以上4才未満：1/3包、3回
2才未満：服用させないこと

用法関連注意 ●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
成分分量 3包(6g)中

成分

分量

内訳

葛根湯エキス(3/4量) 3600mg (カッコン6g、マオウ・タイソウ各3g、ケイヒ・シヤクヤク各2.25g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ0.75g)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖水和物、含水二酸化ケイ素
保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 密の容器に入れ替えないでください。（服用の原因により、品質が変化します）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

消費者相談窓口 会社名：シオノギヘルスケア株式会社

問い合わせ先：医薬情報センター

電話：大阪06-6209-6948、東京03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売会社 大峰堂薬品工業（株）奈良県大和高田市横成柿574

販売会社 シオノギヘルスケア（株）添付文書情報：J1701000181_01_B.pdf

剤形 顆粒

リスク区分 第2類医薬品