

医療用と同量の有効成分を配合！しつこい「たん」に効く！

No20 ★ムコダイン去たん錠Pro500 10錠

第2類医薬品



【製品の特徴】

去痰薬

日本薬局方 L-カルボシステイン錠

ムコダイン去たん錠Pro500はL-カルボシステインの作用により、たんの切れをよくする去たん薬です。

【使用上の注意】

＜してはいけないこと＞

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬

＜相談すること＞

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人

(4) 高齢者

(5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

(6) 次の症状のある人 高熱

(7) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位…症状

皮膚…発疹・発赤、かゆみ

消化器…吐き気・嘔吐、食欲不振、下痢、腹痛、腹部膨満感、口のかわり

呼吸器…息苦しさ

その他…発熱、むくみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称…症状

ショック(アナフィラキシー)…服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症…高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤などが持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害…発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【効果・効能】

たん

【内容量】

10錠

【成分】

ムコダイン去たん錠Pro500は、白色のフィルムコーティング錠で、3錠(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成分…分量…作用

L-カルボシステイン…1500mg…たんの切れをよくする

添加物として クロスカルメロースナトリウム、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸マグネシウム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルクを含有しています。

【用法・用量】

次の量を水またはぬるま湯でおのみください。また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

年齢…1回量…1日服用回数

成人(15才以上)…1錠…3回

15才未満…服用しない

【用法・用量に関連する注意】

●定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して表面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) PTPシートから出して他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり、品質が変化します)

(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

【リスク区分】第2類医薬品

【製造販売元】

シオノギヘルスケア(株)

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア7階

TEL 06-6202-2728(代表)