眠くなりにくい。1日1回で効く急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和

No21　★ポジナールEP錠　20錠

第2類医薬品



◆ポジナールEP錠は、医療用成分エピナスチン塩酸塩を配合したお薬です。
◆エピナスチン塩酸塩は、体内でアレルギー症状を引き起こす原因物質の放出を阻害する作用があり、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった症状を改善します。
◆1日1回就寝前の服用で作用を発揮します。
花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
本品1錠(1日量)中

成分・・・分量
エピナスチン塩酸塩・・・20mg

添加物:乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン

〈用法・用量〉
次の量を1日1回、就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。
年齢・・・1回量
成人(15才以上)・・・1錠
15才未満:服用しないでください。
内容量　　20錠 × 3個
効能　　花粉、ハウスダストになどによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:鼻水、鼻づまり、くしゃみ
用法・用量　　次の量を1日1回、就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。
〔 年 齢 〕:〔1回服用量〕:〔1日服用回数〕
成人(15才以上):1錠:1日1回

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始めると効果的です。
(3)錠剤の取り出し方
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)
成分・分量(1錠(1E エピナスチン塩酸塩…20mg…花粉、ハウスダストなどによる鼻のアレルギー症状をおさえます。

ご注意　　●してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)15才未満の小児。
(3)次の診断を受けた人。 肝臓病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
　他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、
　抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒しないでください

●相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

(6)気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
(7)エピナスチン塩酸塩を10mg含有する医薬品から本剤に変更しようとしている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
〔関係部位〕:〔症 状〕
皮膚:発疹・発赤、はれ、かゆみ
消化器:吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感、腹痛、胃重感、胃もたれ感、腹部膨満感、食欲不振
精神神経系:めまい、不眠、頭痛、頭がボーッとする、しびれ感、悪夢、幻覚、幻聴
呼吸器:息苦しい
循環器:動悸
泌尿器:排尿困難、頻尿、血尿、蛋白尿
その他:むくみ、ほてり、胸痛、痰がからむ、倦怠感、鼻づまり、月経異常、苦味を感じる、味覚が弱くなる、女性化乳房(男性に見られる女性のような乳房)、乳房が大きくなる
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
〔症状の名称〕:〔症 状〕
肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少:血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

3.3服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢、眠気

4.1週間位服用(他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む)しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5.症状の改善が見られても2週間(他のエピナスチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む)を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
(4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

◆その他、本品記載の使用法・使用上の注意をよくお読みの上ご使用ください。
使用期限　　出荷時より1年以上あるものをお送りします。
副作用救済制度　(独)医薬品医療機器総合機構
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
メーカー名
又は販売業者名　販売元:ノーエチ薬品株式会社
大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室:072-331-0417
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元:株式会社 廣昌堂
富山県射水市水戸田2841