

アレルギー性鼻炎，急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり，鼻水（鼻汁過多），くしゃみ，頭重（頭が重い）

No23 ★爽AL点鼻薬 16ml

第2類医薬品



製品の特徴	花粉やハウスダスト（室内のほこり）等によるアレルギーが増えています。鼻に起こる症状は，鼻水，鼻づまり，くしゃみ等の不快な症状です。本剤は鼻水，くしゃみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩，鼻づまりを緩和するナファゾリン塩酸塩，殺菌作用のあるベンゼトニウム塩化物を配合しています。										
使用上の注意	■してはいけないこと 長期連用しないで下さい。（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなります） ■相談すること 1. 次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 （1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人 （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （4）次の診断を受けた人 高血圧，心臓病，糖尿病，甲状腺機能障害，緑内障 2. 使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので，直ちに使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 【関係部位：症状】 皮膚：発疹・発赤，かゆみ 鼻：はれ，刺激感 3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。										
効能・効果	アレルギー性鼻炎，急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり，鼻みず（鼻汁過多），くしゃみ，頭重（頭が重い）										
用法・用量	【年齢：1回使用量：1日使用回数】 成人（15歳以上）：1～2度ずつ：1～5回鼻腔内に噴霧して下さい。（適用間隔は3時間以上おいて下さい） 7歳以上15歳未満：1～2度ずつ：1～5回鼻腔内に噴霧して下さい。（適用間隔は3時間以上おいて下さい） 7歳未満：使用しないで下さい。										
用法関連注意	（1）過度に使用すると，かえって鼻づまりを起こすことがあります。 （2）7歳以上の小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。 （3）点鼻用にのみ使用して下さい。										
成分分量	100mL中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th></tr><tr><td>ナファゾリン塩酸塩</td><td>50mg</td></tr><tr><td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>500mg</td></tr><tr><td>塩酸リドカイン（無水物として）</td><td>300mg</td></tr><tr><td>ベンゼトニウム塩化物</td><td>20mg</td></tr></table> 等張化剤	成分	分量	ナファゾリン塩酸塩	50mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	塩酸リドカイン（無水物として）	300mg	ベンゼトニウム塩化物	20mg
成分	分量										
ナファゾリン塩酸塩	50mg										
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg										
塩酸リドカイン（無水物として）	300mg										
ベンゼトニウム塩化物	20mg										
添加物											
保管及び取扱い上の注意	（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。 （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。 （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります） （4）他の人と共用しないで下さい。 （5）表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。										
消費者相談窓口	会社名：第一三共ヘルスケア株式会社 住所：〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10 問い合わせ先：お客様相談室 電話：0120-337-336 受付時間：9:00～17:00（土，日，祝日を除く）										
製造販売会社	第一三共ヘルスケア（株）添付文書情報：J1101000262_04_A.pdf 会社名：第一三共ヘルスケア株式会社 住所：東京都中央区日本橋3-14-10										