

食欲不振・胃もたれ・膨満感に

## No43大正漢方胃腸薬 12包

第2類医薬品



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔関係部位〕〔症状〕

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

〔症状の名称〕肝機能障害

〔症状〕発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

胃のもたれ、胃部不快感、胃炎、胃痛、げっぷ、食欲不振、腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ、胃酸過多、腹痛、はきけ(むかつき、悪心)

### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

〔年令〕15才以上

〔1回量〕1包

〔服用回数〕1日3回

〔年令〕5～14才

〔1回量〕1/2包

〔服用回数〕1日3回

〔年令〕5才未満

〔1回量〕服用しないこと

〔服用回数〕服用しないこと

### 保管および取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### メーカー問い合わせ先

大正製薬(株)お客様119番室

電話番号：03-3985-1800

受付時間：8:30～21:00