

かぜの諸症状の緩和に《ブロムヘキシン塩酸塩配合》

No6 ★パブロンSα錠 75錠

第②類医薬品



製品の特徴

- ◆パブロンSα錠は、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩を配合したかぜ薬です。
- ◆8つの有効成分が、かぜの不快感を効果的に改善します。
- ◆5才から服用でき、家族の常備薬にも適しています。

使用上の注意

- してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
 - 1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 - 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
 - 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 - 5. 服用前後は飲酒しないでください
 - 6. 長期連用しないでください
- 相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ
消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系: めまい
泌尿器: 排尿困難
その他: 過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害: 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害: 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎: 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、

発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく:息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談し
便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、悪寒、発熱、頭痛、関節
の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。(食後なるべく30分以内に服用してください)

[年令:1回量:服用回数]

15才以上:3錠:1日3回

11才～14才:2錠:1日3回

5才～10才:1錠:1日3回

5才未満:服用しないこと

用法関連注意

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が
変わることがあります)

成分分量

3錠中

成分	分量
プロムヘキシン塩酸塩	4mg
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg
アセトアミノフェン	300mg
マレイン酸カルビノキサミン	2.5mg
無水カフェイン	25mg
ビスイプテアミン	8mg
リボフラビン	4mg

添加物

セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、ステアリン酸マグネシウ
ム、香料、バニリン、安息香酸ベンジル

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後
は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)

消費者相談窓口

会社名:大正製薬株式会社

問い合わせ先:お客様119番室

電話:03-3985-1800

製造販売会社

受付時間:8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

大正製薬(株)添付文書情報: K1506000005_02_A.pdf

会社名:大正製薬株式会社

住所:東京都豊島区高田3丁目24番1号