

インドメタシン配合肩こり、筋肉痛に広範囲に塗れる[首曲がりタイプ]

No81 ★パテックス液ID 40ml



使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) じっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないで下さい。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5・6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

効能関連注意

用法・用量 1日4回を限度として適量を患部に塗布して下さい。

用法関連注意 (1) 使用法を厳守して下さい。

(2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

(3) 11歳未満の小児に使用させないで下さい。

(4) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

(5) 外用にのみ使用して下さい。

(6) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

(7) 1週間あたり50mLを超えて使用しないで下さい。

[容器の使い方]

スポンジ面を下にしてゆっくり患部に数回押しあて、スポンジに薬液を十分に浸透させてから使用して下さい。

成分分量 100g中

成分

分量

インドメタシン 1.0g

l-メントール 3.0g

添加物 アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、BHT、亜硫酸水素Na、ベンジルアルコール、トリエタノールアミン、クエン酸

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 火気に近づけないで下さい。

(5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。

(6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者相談窓口 会社名: 第一三共ヘルスケア株式会社

お問い合わせ先: お客様相談室

住所: 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先: お客様相談室

電話: 0120-337-336